

肺癌	【非小細胞肺癌】CDDP＋CPT-11 療法
----	------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [80mg/m ²] ②イリノテカン点滴静注液(イリノテカン) [60mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day									
					1	2	3	・	8	・	15	・	28	
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	15 分	●									
	アロキシ静注 0.75mg	1V												
	デキサート 3.3mg	2A												
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	15 分		●	●							
	デキサート 3.3mg	2A												
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	15 分					●		●			
	グラニセトロン静注液 1mg	1A												
	デキサート 3.3mg	2A												
4	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●									
	マグネゾール 2g	0.5A												
5	ブドウ糖液注 5% 250mL	1 袋	DIV	90 分	●				●		●			
	イリノテカン点滴静注液	[上記参照]												
6	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●									
7	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●									
	シスプラチン	[上記参照]												
8	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●									
	フロセミド注射液 20mg	1A												
9	ラクテック 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●	●							
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●	●							
11	ラクテック 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●	●							

【備考】 Day1 には、制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
