

肺癌	【小細胞肺癌】CDDP＋CPT-11 療法
----	-----------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [60mg/m ²] ②イリノテカン点滴静注液(イリノテカン) [60mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day											
					1	2	3	・	8	・	15	・	28			
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●											
2	ブドウ糖注 5% 500mL マグネゾール 2g	1 袋 0.5A	DIV	3 時間	●											
3	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分	●											
4	生食 100mL デキサート 3.3mg	1 瓶 2A	DIV	30 分		●	●									
5	生食 100mL グラニセترون静注液 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 2A	DIV	30 分					●		●					
6	ブドウ糖液注 5% 250mL イリノテカン点滴静注液	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分	●				●		●					
7	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間	●											
8	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分	●											
9	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●									
10	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●									
11	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●											

【備考】 Day1 には、制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
