肺癌	CBDCA＋PEM＋Bmab 療法

レジメン概要

抗がん剤 ［投与量］	①カルボプラチン点滴静注液（ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ） ［AUC = 5］ ②アリムタ静注用（ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ） ［500mg/m^2］ ③ベバシズマブ BS 点滴静注（ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ）［15mg/kg］
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day 1	・	・	・	・	・	・	・	21
1	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●								
	アロキシ静注 0.75mg	1V											
	デキサート 3.3mg	2A											
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	10 分	●								
	アリムタ静注用	［上記参照］											
3	生食 50mL	1 瓶	DIV	10 分	●								
4	生食 250mL	1 袋	DIV	2 時間	●								
	カルボプラチン点滴	［上記参照］											
5	生食 100mL	1 瓶	DIV	90 分	●								
	ベバシズマブ BS 点滴静注	［上記参照］											

【備考】

投与 1 週間以上前よりパンビタン 1g1×経口(連日服用)、メチコバール注 500μg 2A 筋注（9 週間おき）