

肺癌	CBDCA+PTX 療法
----	--------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①カルボプラチン点滴静注液(カルボプラチン) [AUC = 5] ②パクリタキセル注(パクリタキセル) [200mg/m ²]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21～28 日間

催吐性リスク	中等度
--------	-----

1 コース期間	21～28 日間
---------	----------

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day								
					1	.	.	.	.	.	.	.	21
1	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●								
	グラニセトロン静注液 1mg	1A											
	ポララミン注 5mg	1A											
	デキサート 3.3mg	5A											
2	生食 20mL	1A	IV		●								
	ファモチジン注射用 20mg	1A											
3	生食 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●								
	パクリタキセル注	[上記参照]											
4	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●								
	カルボプラチン点滴	[上記参照]											

1	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●
	グラニセトロン静注液 1mg	1A			
	ポララミン注 5mg	1A			
	デキサート 3.3mg	5A			

2	生食 20mL	1A	IV	●
	ファモチジン注射用 20mg	1A		

3	生食 500mL パクリタキセル注	1 袋 [上記参照]	DIV	3 時間	●
---	----------------------	---------------	-----	------	---

4	生食 250mL カルボプラチン点滴	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分	●
---	-----------------------	---------------	-----	------	---

【備考】
