

肺癌	CBDCA+PTX+Bmab 療法
----	-------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①カルボプラチン点滴静注液(カルボプラチン) [AUC = 5] ②パクリタキセル注(パクリタキセル) [200mg/m ²] ③ベバシズマブ BS 点滴静注(ベバシズマブ)[15mg/kg]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21～28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day									
					1	.	.	.	.	.	.	.	.	21
1	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●									
	グラニセロン静注液 1mg	1A												
	ポララミン注 5mg	1A												
	デキサート 3.3mg	5A												
2	生食 20mL	1A	IV		●									
	ファモチジン注射用 20mg	1A												
3	生食 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●									
	パクリタキセル注	[上記参照]												
4	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●									
	カルボプラチン点滴	[上記参照]												
5	生食 100mL	1 瓶	DIV	90 分	●									
	ベバシズマブ BS 点滴静注	[上記参照]												
6	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●									

【備考】
