

肺癌	CDDP+VNB 療法
----	-------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [60mg/m ²] ②ロゼウス静注(ビルルビン) [20mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	21～28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day											
					1	2	3	・	8	・	・	・	28			
1	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●											
2	ブドウ糖注 5% 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●											
	マグネゾール 2g	0.5A														
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●											
	アロキシ静注 0.75mg	1V														
	デキサート 3.3mg	3A														
4	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分		●	●									
	デキサート 3.3mg	2A														
5	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分					●							
	グラニセロン静注 1mg	1A														
6	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●				●							
	ロゼウス静注	[上記参照]														
7	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●				●							
8	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●											
	シスプラチン	[上記参照]														
9	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分	●											
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●									
11	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●									

【備考】 Day1 には、制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
