

肺癌	キイトルーダ＋CBDCA＋nab-PTX 療法
----	-------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①キイトルーダ点滴静注（ペムブロリスマブ） [200mg/body] ②カルボプラチン点滴静注液（カルボプラチン） [AUC = 5] ③アブラキサン点滴静注用（アルブミン懸濁型パクリタキセル） [100mg/m ²]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day							
					1	・	8	・	15	・	・	・ 21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●		●		●			
2	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●							
	グラニセトロン静注液 1mg	1A										
	デキサート 3.3mg	2A										
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●							
	キイトルーダ点滴静注	[上記参照]										
4	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●							
5	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●		●		●			
	アブラキサン点滴静注用	[上記参照]										
6	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●							
7	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●							
	カルボプラチン点滴	[上記参照]										

【備考】
