

肺癌	キイトルーダ+CBDCA+PEM 療法 《維持療法》キイトルーダ+PEM 療法
----	--

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①キイトルーダ点滴静注(ヘムフロリスマフ) [200mg/body] ②カルボプラチン点滴静注液(カルボプラチン) [AUC = 5] ③アリムタ静注用(ヘムトレキセト) [500mg/m ²]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール(1～4 コースまで)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day										
					1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●										
2	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●										
	アロキシ静注 0.75mg	1V													
	デキサート 3.3mg	2A													
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●										
	キイトルーダ点滴静注	[上記参照]													
4	生食 100mL	1 瓶	DIV	10 分	●										
	アリムタ静注用	[上記参照]													
5	生食 50mL	1 瓶	DIV	10 分	●										
6	生食 250mL	1 袋	DIV	2 時間	●										
	カルボプラチン	[上記参照]													

投与スケジュール(5 コース目以降)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day										
					1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●										
2	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●										
	グラニセトロン静注液 1mg	1A													
	デキサート 3.3mg	2A													
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●										
	キイトルーダ点滴静注	[上記参照]													
4	生食 100mL	1 瓶	DIV	10 分	●										
	アリムタ静注用	[上記参照]													

【備考】

キイトルーダ＋CBDCA＋PEM を 4 コース施行後、《維持療法》を施行。

投与 1 週間以上前よりパンプタン 1g1 × 経口(連日服用)、メチコバル注 500μg 2A 筋注(9 週間おき)