

乳癌	PER+Tmab+DTX 療法
----	-----------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①パージェタ点滴静注(ヘルツマブ) [初回 840 mg/body、以後 420 mg/body] ②トラスツズマブ BS 静注用(トラスツズマブ) [初回 8mg/kg、以後 6mg/kg] ③ドセタキセル点滴静注(ドセタキセル) [75 mg/m <sup>2</sup> ]
催吐性リスク	軽度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day						
					1	.	.	.	.	21	
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●						
2	生食 250mL パージェタ点滴静注	1 袋 [上記参照]	DIV	1 時間	●						
3	生食 50mL	1 瓶	DIV	1 時間	●						
4	生食 250mL トラスツズマブ BS 点滴静注液	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分	●						
5	生食 50mL グラニセトロン静注液 1 mg デキサート 3.3 mg	1 瓶 1A 2A	DIV	15 分	●						
6	生食 250mL ドセタキセル点滴静注	1 袋 [上記参照]	DIV	1 時間	●						

【備考】
------