

乳癌	PER＋Tmab＋PTX 療法
----	-----------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①パージェタ点滴静注(ペルツスマブ) [初回 840 mg/body、以後 420 mg/body] ②トラスツズマブ BS 静注用(トラスツスマブ) [初回 8mg/kg、以後 6mg/kg] ③パクリタキセル注(パクリタキセル) [80 mg/m ²]
催吐性リスク	軽度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day						
					1	・	8	・	15	・	21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●		●		●		
2	生食 250mL	1 袋	DIV	1 時間	●						
	パージェタ点滴静注	[上記参照]									
3	生食 50mL	1 瓶	DIV	1 時間	●						
4	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●						
	トラスツズマブ BS 点滴静注液	[上記参照]									
5	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●		●		●		
	グラニセトロン静注液 1mg	1A									
	ポララミン注 5mg	1A									
	デキサート 3.3mg	2A									
6	生食 20mL	1A	IV		●		●		●		
	ファモチジン注射用 20mg	1A									
7	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●		●		●		
	パクリタキセル注	[上記参照]									

【備考】
