

|    |            |
|----|------------|
| 乳癌 | アブラキサン単剤療法 |
|----|------------|

レジメン概要

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 抗がん剤 [投与量] | ①アブラキサン点滴静注用(アルブミン懸濁型パクリタキセル) [260 mg/m <sup>2</sup> ] |
| 催吐性リスク     | 軽度                                                     |
| 1 コース期間    | 21 日間                                                  |

投与スケジュール

| Rp | 薬剤名            | 用量     | 投与法 | 時間   | Day |   |   |   |   |    |
|----|----------------|--------|-----|------|-----|---|---|---|---|----|
|    |                |        |     |      | 1   | . | . | . | . | 21 |
| 1  | 生食 100mL       | 1 瓶    | DIV | 30 分 | ●   |   |   |   |   |    |
|    | グラニセトロン静注液 1mg | 1A     |     |      |     |   |   |   |   |    |
|    | デキサート 3.3mg    | 2A     |     |      |     |   |   |   |   |    |
| 2  | 生食 100mL       | 1 瓶    | DIV | 30 分 | ●   |   |   |   |   |    |
|    | アブラキサン点滴静注用    | [上記参照] |     |      |     |   |   |   |   |    |
| 3  | 生食 50mL        | 1 瓶    | DIV | 15 分 | ●   |   |   |   |   |    |

|      |
|------|
| 【備考】 |
|------|