

|    |         |
|----|---------|
| 乳癌 | エンハーツ療法 |
|----|---------|

レジメン概要

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 抗がん剤 [投与量] | ①エンハーツ点滴静注用(トラスツスマブ テルクステカン) [5.4 mg/kg] |
| 催吐性リスク     | 中等度                                      |
| 1 コース期間    | 21 日間                                    |

投与スケジュール

| Rp | 薬剤名            | 用量     | 投与法 | 時間   | Day |   |   |   |   |    |
|----|----------------|--------|-----|------|-----|---|---|---|---|----|
|    |                |        |     |      | 1   | . | . | . | . | 21 |
| 1  | 生食 100mL       | 1 瓶    | DIV | 30 分 | ●   |   |   |   |   |    |
| 2  | ブドウ糖注 5%100mL  | 1 瓶    | DIV | 30 分 | ●   |   |   |   |   |    |
|    | グラニセトロン静注液 1mg | 1A     |     |      |     |   |   |   |   |    |
|    | デキサート 3.3mg    | 2A     |     |      |     |   |   |   |   |    |
| 3  | ブドウ糖注 5%100mL  | 1 瓶    | DIV | 90 分 | ●   |   |   |   |   |    |
|    | エンハーツ点滴静注用     | [上記参照] |     |      |     |   |   |   |   |    |
| 4  | ブドウ糖注 5%20mL   | 1A     | IV  |      | ●   |   |   |   |   |    |

|      |
|------|
| 【備考】 |
|------|