

大腸癌	2 週毎 Bmab + CPT-11 + S-1 (IRIS)療法
-----	-----------------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①ベバシズマブ BS 点滴静注 (ベバシズマブ) [5 mg/kg] ②イリノテカン点滴静注 (イリノテカン) [125 mg/m ²] ③エスワンタイホウ配合 OD 錠 (テガフル・キメラシル・オテラシル) [80mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day					
					1	.	.	15	.	28
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●			●		
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	90 分	●			●		
	ベバシズマブ BS 点滴静注	[上記参照]								
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●			●		
	グラニセロン静注液 1mg	1A								
	デキサート注射液 3.3 mg	2A								
4	生食 500mL	1 袋	DIV	90 分	●			●		
	イリノテカン点滴静注	[上記参照]								
1	エスワンタイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服		Day1～14					

【備考】
