

大腸癌	Pmab＋FOLFIRI 療法
-----	-----------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①ベクティビックス点滴静注(パニツムマブ) [6mg/kg] ②レボホリナート注(レボホリナート) [200mg/m ²] ③イリノテカン点滴静注(イリノテカン) [150mg/m ²] ④フルオロウラシル注(フルオロウラシル) [400mg/m ²] ⑤フルオロウラシル注(フルオロウラシル) [2400mg/m ²]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	14 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day
					1 . . 14
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	1 時間	●
	ベクティビックス点滴静注	[上記参照]			
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●
	グラニセトロン静注液 1mg	1A			
	デキサート注射液 3.3mg	2A			
4	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●
	レボホリナート注	[上記参照]			
	※イリノテカンと同時に投与				
5	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●
	イリノテカン点滴静注	[上記参照]			
	※レボホリナートと同時に投与				
6	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分	●
	フルオロウラシル注	[上記参照]			
7	生食 100mL	1 瓶	DIV	46 時間	●
	フルオロウラシル注	[上記参照]			
	(インフューザポンプに充填)				

【備考】
