大腸癌	Bmab＋XELOX 療法

レジメン概要

抗がん剤［投与量］	①ベバシズマブ BS 点滴静注（ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ）［7.5 mg/kg］ ②オキサリプラチン点滴静注液（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）［130 mg/m^2］ ③ゼローダ錠（ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ）［2000mg/m^2/day(分 2)］
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day 1 ・ ・ ・ ・ ・ 21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	90 分	●
	ベバシズマブ BS 点滴静注	［上記参照］			
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●
	グラニセトロン静注液 1mg	1A			
	デキサート 3.3mg	2A			
4	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●
	オキサリプラチン点滴静注液	［上記参照］			
1	ゼローダ錠	［上記参照］	内服		Day1～14（1 夕～15 朝）

【備考】