

大腸癌	Bmab＋FOLFOXIRI 療法
-----	-------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①ベバシズマブ BS 点滴静注（ベバシズマブ） [5 mg/kg] ②イリノテカン点滴静注（イリノテカン） [165 mg/m ²] ③レボホリナート注（レボホリナート） [200 mg/m ²] ④オキサリプラチン点滴静注液（オキサリプラチン） [85 mg/m ²] ⑤フルオロウラシル注（フルオロウラシル） [3200 mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	14 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day			
					1	・	・	14
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●			
2	生食 100mL	1 瓶	DIV	90 分	●			
	ベバシズマブ BS 点滴静注	[上記参照]						
3	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●			
	グラニセトロン静注液 1mg	1A						
	デキサート注射液 3.3mg	3A						
4	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●			
	イリノテカン点滴静注	[上記参照]						
5	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●			
	レボホリナート注	[上記参照]						
	※オキサリプラチンと同時に投与							
6	ブドウ糖液 5%250mL	1 袋	DIV	2 時間	●			
	オキサリプラチン点滴静注	[上記参照]						
	※レボホリナートと同時に投与							
7	生食 100mL	1 瓶	DIV	46 時間	●			
	フルオロウラシル注	[上記参照]						
	（インフューザポンプに充填）							

【備考】 制吐剤としてイメンド（アプレピタント）カプセルもしくはプロイメンド（ホスアプレピタント）を使用。
