

胃癌	SP (CDDP + S-1) 療法
----	--------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [60mg/m ²] ②エスワンタイホウ配合 OD 錠(テガフル・ギメラシル・オテラシル) [80mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28～35 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day									
					1	・	7	8	9	・	・	28		
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間			●		●					
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間			●		●					
3	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	6 時間				●						
4	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間				●						
5	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間				●						
	マグネゾール 2g/20mL	0.5A												
6	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分				●						
	アロキシ静注 0.75mg	1V												
	デキサート 3.3mg	3A												
7	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間				●						
	シスプラチン	[上記参照]												
8	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分				●						
9	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間				●						
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間				●						
11	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分					●					
	デキサート注射液 3.3 mg	2A												
1	エスワンタイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服		Day1～21									

【備考】 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
