

胃癌	CDDP+CPT-11 療法
----	----------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [80mg/m ²] ②イリノテカン点滴静注液(イリノテカン) [70mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day							
					0	1	2	・	・	15	・	28
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●					
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●					
3	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	6 時間		●						
4	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●						
5	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL	1 袋 0.5A	DIV	3 時間		●						
6	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分		●						
7	生食 100mL デキサート 3.3mg	1 瓶 2A	DIV	30 分			●					
8	生食 100mL グラニセトロン静注 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 2A	DIV	30 分						●		
9	ブドウ糖液注 5% 250mL イリノテカン点滴静注液	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分		●				●		
10	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間		●						
11	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分		●						
12	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	4 時間		●						
13	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間 30 分		●						

【備考】 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
