

胃癌	XP (CDDP+Xeloda) 療法
----	---------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [80mg/m ²] ②ゼローダ錠(カペシタビン) [2000mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day						
					0	1	2	.	.	.	21
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●				
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●				
3	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	6 時間		●					
4	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●					
5	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL	1 袋 0.5A	DIV	3 時間		●					
6	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分		●					
7	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間		●					
8	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分		●					
9	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●					
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●					
11	生食 100mL デキサート注射液 3.3 mg	1 瓶 2A	DIV	30 分			●				
1	ゼローダ錠	[上記参照]	内服		Day1～14(1 夕～15 朝)						

【備考】 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
