

胃癌	Tmab＋XP (CDDP＋Xeloda) 療法 ≪維持療法≫Tmab＋Xeloda 療法
----	--

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①トラスツズマブ BS 静注用(トラスツズマブ) [初回 8mg/kg、以後 6mg/kg] ②シスプラチン静注用(シスプラチン) [80mg/m ²] (1～6 コース) ③ゼローダ錠(カペシチン) [2000mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	高度(Tmab＋XP 療法) 軽度(Tmab＋Xeloda 療法)
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール(1～6 コース目)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day										
					0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	21
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●								
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●								
3	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間		●									
4	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL	1 袋 0.5A	DIV	3 時間		●									
5	生食 250mL トラスツズマブ	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分		●									
6	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分		●									
7	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間		●									
8	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分		●									
9	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●									
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●									
11	生食 100mL デキサート注射液 3.3 mg	1 瓶 2A	DIV	30 分			●								
1	ゼローダ錠	[上記参照]	内服												Day1～14(1 夕～15 朝)

投与スケジュール(6コース目以降)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day					
					1	2	・	・	・	21
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●					
2	生食 250mL	1 袋	DIV	90 分	●					
	トラスツズマブ	[上記参照]		30 分まで短縮可						
1	ゼローダ錠	[上記参照]	内服		Day1～14					

【備考】
Tmab＋XP 療法 6 コース施行後、Tmab＋Xeloda 療法を病勢進行まで
シスプラチン施行時には、制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。