

胃癌	DTX+S-1 療法(術後)
----	----------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①ドセタキセル点滴静注液(ドセタキセル) [40mg/m ²] ②エスワнтаイホウ配合 OD 錠(テガフル・ギメラシル・オテラシル) [80mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	軽度
1 コース期間	1 コース目:S-1 単剤 21 日間 2～7 コース目:S-1+DTX 21 日間 8 コース目～手術後 1 年まで:S-1 単剤 42 日間

投与スケジュール(1 コース)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day
					1 21
1	エスワнтаイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服		Day1～14

投与スケジュール(2～7 コース)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day
					1 21
1	生食 50mL グラニセトロン静注液 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 2A	DIV	30 分	●
2	生食 250mL ドセタキセル点滴静注液	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分	●
3	生食 50mL	1 袋	DIV	5 分	●
1	エスワнтаイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服		Day1～14

投与スケジュール(8 コース～)

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day
					1 42
1	エスワнтаイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服		Day1～28

【備考】
