

胃癌	Tmab + SP (CDDP+S-1) 療法
----	-------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①トラスツズマブ BS 静注用(トラスツズマブ) [初回 8mg/kg、以後 6mg/kg] ②シスプラチン静注用(シスプラチン) [60mg/m ²] ③エスワンタイホウ配合 OD 錠(テガフル・キメラシル・オテラシル) [80mg/m ² /day(分 2)]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day									
					0	1	2	・	・	・	・	21		
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●							
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●							
3	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間		●								
4	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL	1 袋 0.5A	DIV	3 時間		●								
5	生食 250mL トラスツズマブ	1 袋 [上記参照]	DIV	90 分		●								
6	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分		●								
7	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間		●								
8	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	30 分		●								
9	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●								
10	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間		●								
11	生食 100mL デキサート注射液 3.3 mg	1 瓶 2A	DIV	30 分			●							
1	エスワンタイホウ配合 OD 錠	[上記参照]	内服											Day1~14

【備考】
 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。