

|     |        |
|-----|--------|
| 食道癌 | DTX 療法 |
|-----|--------|

レジメン概要

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 抗がん剤 [投与量] | ①ドセタキセル点滴静注液(ドセタキセル) [60mg/m <sup>2</sup> ] |
| 催吐性リスク     | 軽度                                          |
| 1 コース期間    | 21 日間                                       |

投与スケジュール

| Rp | 薬剤名            | 用量     | 投与法 | 時間   | Day |   |   |   |   |   |    |
|----|----------------|--------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|----|
|    |                |        |     |      | 1   | . | . | . | . | . | 21 |
| 1  | 生食 50mL        | 1 瓶    | DIV | 15 分 | ●   |   |   |   |   |   |    |
|    | グラニセトロン静注液 1mg | 1A     |     |      |     |   |   |   |   |   |    |
|    | デキサート 3.3mg    | 2A     |     |      |     |   |   |   |   |   |    |
| 2  | 生食 250mL       | 1 袋    | DIV | 1 時間 | ●   |   |   |   |   |   |    |
|    | ドセタキセル点滴静注液    | [上記参照] |     |      |     |   |   |   |   |   |    |

|      |
|------|
| 【備考】 |
|------|