

食道癌	FP 療法
-----	-------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①フルオロウラシル注(フルオロウラシル) [800mg/m ²] ②シスプラチン注(シスプラチン) [80mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day												
					1	2	3	4	5	・	・	28					
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●												
	マグネゾール 2g	0.5A															
2	生食 500mL	1 袋	DIV	24 時間	●	●	●	●	●								
	生食 1000mL	1 袋															
	フルオロウラシル注	[上記参照]															
3	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●												
	アロキシ静注 0.75mg	1V															
4	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●												
	デキサート 3.3mg	3A															
5	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分		●	●	●									
	デキサート 3.3mg	2A															
6	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●												
	シスプラチン注	[上記参照]															
7	ソルデム 3A500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●	●										
	ビタメジン静注用	1V															
8	ラクテック 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●										
	フロセミド注射液 20 mg	0.5A															

【備考】 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
