

食道癌	放射線併用 FP 療法
-----	-------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①フルオロウラシル注(フルオロウラシル) [700mg/m ²] ②シスプラチン注(シスプラチン) [70mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day											
					1	2	3	4	・	・	29	30	31	32	・	
1	生食 100mL	1 瓶	DIV	30 分	●							●				
	マグネゾール 2g	0.5A														
2	生食 500mL	1 袋	DIV	24 時間	●	●	●	●			●	●	●	●		
	生食 1000mL	1 袋														
	フルオロウラシル注	[上記参照]														
3	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●						●					
	アロキシ静注 0.75mg	1V														
4	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分	●						●					
	デキサート 3.3mg	3A														
5	生食 50mL	1 瓶	DIV	15 分		●	●	●				●	●	●		
	デキサート 3.3mg	2A														
6	生食 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●						●					
	シスプラチン注	[上記参照]														
7	ソルデム 3A500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●	●				●	●	●			
	ビタメジン静注用	1V														
8	ラクテック 500mL	1 袋	DIV	3 時間	●	●	●				●	●	●			
	フロセミド注射液 20 mg	0.5A														

【備考】 制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。
