

膵臓癌	FOLFIRINOX 療法
-----	---------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①オキサリプラチン点滴静注液(オキサリプラチン) [85mg/m ²] ②レボホリナート注(レボホリナート) [200mg/m ²] ③イリノテカン点滴静注(イリノテカン) [180mg/m ²] ④フルオロウラシル注(フルオロウラシル) [bolus400mg/m ²] , [2400mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	14 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day						
					1	.	.	.	.	.	14
1	生食 100mL グラニセトロン静注 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 3A	DIV	30 分	●						
2	ブドウ糖注 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間	●						
3	ブドウ糖注 5% 250mL レボホリナート注 ※イリノテカンと同時に投与	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間	●						
4	ブドウ糖注 5% 250mL イリノテカン点滴静注 ※レボホリナートと同時に投与	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間	●						
5	生食 50mL フルオロウラシル注	1 瓶 [上記参照]	DIV	5 分	●						
6	生食 100mL フルオロウラシル注	1 瓶 [上記参照]	DIV	46 時間	●						

【備考】

制吐剤としてイメンド(アフレピタント)カプセル内服またはプロイメンド(ホスアフレピタント)あり。