

胆道癌	GC 療法
-----	-------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [25mg/m ²] ②ゲムシタビン点滴静注液(ゲムシタビン) [1000mg/m ²]
催吐性リスク	中等度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day					
					1	・	8	・	・	21
1	ソルデム 3A 500ml ※主管	1 袋	DIV	90 分	●		●			
2	生食 50mL グラニセトロン静注 1 mg デキサート 3.3mg ※側管	1 袋 1A 2A	DIV	15 分	●		●			
3	生食 500mL シスプラチン ※側管	1 袋 [上記参照]	DIV	2h	●		●			
4	ソルデム 3A 500ml ※主管	1 袋	DIV	90 分	●		●			
5	生食 500mL ※主管	1 袋	DIV	90 分	●		●			
6	フロセド®注射液 20 mg ※側管	1A	IV		●		●			
7	生食 50mL ※側管	1 瓶	DIV	15 分	●		●			
8	ブドウ糖液 5%100mL ゲムシタビン点滴静注 ※側管	1 瓶 [上記参照]	DIV	30 分	●		●			

【備考】
