

胸膜中皮腫

CDDP+PEM 療法

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用(シスプラチン) [75mg/m ²] ②アリムタ静注用(ペトレキセド) [500mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day								
					0	1	2	・	・	・	21		
1	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●						
2	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	6 時間	●		●						
3	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	6 時間			●						
4	ソルアセト F 500mL	1 袋	DIV	3 時間			●						
5	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL	1 袋 0.5A	DIV	3 時間			●						
6	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1V 3A	DIV	30 分			●						
7	生食 100mL アリムタ静注用	1 瓶 [上記参照]	DIV	10 分									
8	生食 50mL	1 瓶	DIV	5 分									
9	生食 500mL シスプラチン	1 袋 [上記参照]	DIV	2 時間			●						
10	マンニトール注 20% 300mL	1 瓶	DIV	1 時間			●						
11	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	3 時間			●						
12	ソルデム 3A 500mL	1 袋	DIV	3 時間			●						
13	生食 100mL デキサート 3.3mg	1 瓶 2A	DIV	30 分				●					

【備考】

制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。

投与 1 週間以上前よりパンビタン 1g1 × 経口(連日服用)、メチコバル注 500μg 2A 筋注(9 週間おき)