

胸膜中皮腫	CDDP＋PEM 療法（ショートハイドレーション）
-------	---------------------------

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン静注用（シスプラチン） [75mg/m ²] ②アリムタ静注用（ペムレキセト） [500mg/m ²]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	21 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day					
					1	2	・	・	・	21
1	生食 250mL ※主管	1 袋	DIV	4 時間 30 分	●					
2	生食 100mL アロキシ静注 0.75mg デキサート 3.3mg ※側管	1 瓶 1V 3A	DIV	15 分	●					
5	ソルアセト F 500mL マグネゾール 2g/20mL ※側管	1 袋 0.5A	DIV	1 時間	●					
7	生食 100mL アリムタ静注 ※側管	1 瓶 [上記参照]	DIV	10 分						
8	生食 50mL ※側管	1 瓶	DIV	5 分						
9	生食 500mL シスプラチン ※側管	1 袋 [上記参照]	DIV	1 時間	●					
10	マンニトール注 20% 300mL ※側管	0.5 瓶	DIV	15 分	●					
11	ヴィーン D 500mL ※側管	1 袋	DIV	1 時間	●					
12	ソルデム 3A 500mL ※側管	1 袋	DIV	1 時間	●					

【備考】 制吐剤としてイメンド（アプレピタント）カプセル内服あり。 投与 1 週間以上前よりパンビタン 1g1 × 経口（連日服用）、メチコバル注 500μg 2A 筋注（9 週間おき）
