

尿路上皮癌

GC (GEM + CDDP) 療法

レジメン概要

抗がん剤 [投与量]	①シスプラチン注(シスプラチン) [70mg/m <sup>2</sup> ] ②ゲムシタビン点滴静注液(ゲムシタビン) [1000mg/m <sup>2</sup> ]
催吐性リスク	高度
1 コース期間	28 日間

投与スケジュール

Rp	薬剤名	用量	投与法	時間	Day				
					1	2	8	15	28
1	生食 100mL グラニセトロン静注 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 3A	DIV	30 分	●		●	●	
2	ブドウ糖注 5%100mL ゲムシタビン点滴静注液	1 瓶 [上記参照]	DIV	30 分	●		●	●	
3	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●	●			
4	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	2 時間	●				
5	ヴィーン D 500mL マグネゾール 2g	1 袋 0.5A	DIV	2 時間		●			
6	生食 100mL グラニセトロン静注液 1mg デキサート 3.3mg	1 瓶 1A 2A	DIV	30 分		●			
7	マンニトール注 20mL60g	1 瓶	DIV	30 分		●			
8	生食 500mL シスプラチン注	1 袋 [上記参照]	DIV	3 時間		●			
9	ソルデム 3A 500ml	1 袋	DIV	4 時間		●			
10	ヴィーン D 500mL	1 袋	DIV	4 時間		●			
11	ラクテック 500ml	1 袋	DIV	4 時間		●			

【備考】

制吐剤としてイメンド(アプレピタント)カプセル内服あり。